

ژل موضعی ژانو-بریم®

بریمونیدین ۰,۳۳ درصد

موارد مصرف:

ژانو-بریم به عنوان درمان موضعی در افرادی که قرمزی پوست ناشی از روزاسه (rosacea) دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمای عمومی برای بیمار:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.
- دارو مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده مصرف شود. از مقادیر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.
- این دارو فقط برای استعمال خارجی است.

مکانیسم اثر:

ژل موضعی ژانو-بریم یک آگونیست آلفا آدرنرژیک است که رگ های خونی پوست را منقبض کرده و موجب کاهش قرمزی ناشی از روزاسه می شود.

موارد منع مصرف:

- در افرادی که به بریمونیدین یا هر کدام از مواد تشکیل دهنده ی آن حساسیت دارند منع مصرف دارد.
- برای کودکان زیر دو سال منع مصرف دارد.

هشدارها و احتیاطها:

- ژانو-بریم مناسب افراد بزرگسال (۱۸ سال به بالا) است؛ لذا استفاده از این ژل برای کودکان توصیه نمی شود.
- ژانو-بریم نباید روی پوست تحریک شده و یا زخم های باز استفاده شود.
- از تماس با چشم ها، غشاء مخاطی مثل دهان و بینی خودداری شود.
- بلافاصله پس از مصرف این دارو، دست ها با آب شسته شود.
- از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.

در موارد زیر قبل از استفاده از ژانو-بریم ضروری است با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

- اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید و یا در دوران شیردهی هستید.
- اگر مشکلات قلبی - عروقی دارید.
- اگر مشکلات کلیه و کبد دارید یا سابقه آن را در گذشته داشته اید.
- اگر افسردگی، مشکلات گردش خون یا کاهش گردش خون، در مغز یا قلب و یا سندرم شوگرن دارید.

تداخلات دارویی:

- مهارکننده ی مونو آمین اکسیداز (MAO) که منجر به افت فشار خون می شود.
- داروهای بیهوشی، آرام بخش ها، مواد مخدر، الکل و نوشیدنی های الکلی

- داروهایی که می‌توانند روی متابولیسم و جذب گردش آمین‌ها تاثیر بگذارند مانند: کلرپرومازین، متیل فنیدات، رزرپین
 - مصرف آلفا ۲ آگونیست‌ها، بتابلاکرها و سایر داروهای کاهنده‌ی فشار خون و گلیکوزیدهای قلبی
- بنابراین در صورتی که داروهای دیگری استفاده می‌کنید؛ ضروری است با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.

نحوه مصرف:

همیشه نحوه مصرف را طبق دستور پزشک و یا داروساز خود انجام دهید. اگر بعد از گذراندن ۵ روز از دوره مصرف، علائم بهبودی مشاهده نکردید با پزشک و یا داروساز خود تماس بگیرید.

مقدار مصرف در بزرگسالان:

دارو را روزانه به اندازه یک نخود به طور یکنواخت و به صورت یک لایه نازک، بر روی پیشانی، چانه، بینی و گونه‌ها بمالید. مقدار داروی استفاده شده در روز، نباید از ۱ گرم تجاوز کند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه B. مطالعات کافی و کنترل شده در رابطه با این ژل در زنان باردار وجود ندارد. این ژل موضعی تنها در صورتی در دوران بارداری استفاده شود که بصورت بالقوه منفعت آن بیش از ریسک‌های آسیب‌پذیر آن باشد. هنوز مشخص نیست که این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود یا خیر لذا در صورت مصرف آن با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف بیش از حد دارو به اورژانس و یا مرکز فوریت‌های پزشکی مراجعه کنید.

عوارض جانبی:

شایع‌ترین عوارض که مشاهده شده، قرمزی، خارش و احساس سوزش در پوست صورت می‌باشد.

عوارض احتمالی غیر شایع:

شدیدتر شدن روزاسه، بیماری یا تحریکات پوستی، خشکی زبان، ورم کردن پلک‌ها، سردرد، درد پوستی، احساس سرما یا گرما در پوست، خشکی پوست، گرفتگی بینی، آکنه.

در صورت مشاهده هر یک از عوارض بایستی مصرف دارو را قطع کرده به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق (کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شده و از یخ‌زدگی محافظت شود.

دارنده پروانه ساخت:

شرکت دانش بنیان ژرف اندیشان نوید سلامت (ژانوس)

تهران- ایران

