

پماد موضعی ژانوناید®

دزوناید ۰٫۰۵ درصد

موارد مصرف دارو:

ژانوناید یک کورتیکواستروئید سنتتیک بوده که به منظور درمان درماتیت آتوپیک خفیف تا متوسط در بیماران ۲ سال و بالاتر مورد مصرف قرار می گیرد.

راهنمای عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

• برگه راهنما را تا زمان مصرف کامل دارو نگهداری نمایید.

• دوره‌ی درمان را کامل نمایید.

• دارو را مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده استفاده نمایید و از مقادیر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.

• پزشک خود را از هرگونه بیماری و حساسیت به داروها، غذاها، رنگها و نگه دارنده ها مطلع نمایید.

• در صورت مشاهده‌ی هرگونه عوارض جانبی، حتی عارضه‌ای که در برگه راهنما ذکر نشده، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

• این دارو فقط برای استعمال خارجی است.

تداخلات دارویی:

تداخل دارویی خاصی مشاهده نشده است.

هشدارها و احتیاطات:

• در صورتیکه در حین استفاده از این دارو، بارداری رخ دهد، بایستی هر چه سریعتر به پزشک و یا داروساز خود اطلاع دهید.

• این دارو جهت استفاده موضعی می باشد و از تماس با اطراف لب ها، بینی، پلک ها و چشم، نواحی داخلی دستگاه تناسلی و همچنین پوستهای آسیب دیده خودداری شود.

• در کودکان، صرفاً با نظر پزشک مورد استفاده قرار گیرد.

• از استعمال این دارو در مناطق وسیع پوستی، خصوصاً در کودکان خودداری شود.

• در صورت آسیب تیوب پماد و یا پایان تاریخ انقضاء از مصرف آن خودداری شود.

• از قرار دادن پوشش یا پانسمان برروی ناحیه ای که این دارو استعمال شده است بدون نظر پزشک خودداری کنید.

جذب سیستمیک کورتیکواستروئیدهای موضعی می تواند سبب مهار محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال شود. لذا در مصرف طولانی مدت و یا مقادیر زیاد، می تواند موجب علائم سندروم کوشینگ، هیپرگلیسمی و وجود قند در ادرار در برخی از بیماران شود.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به هریک از اجزای سازنده این دارو، باید از مصرف آن خودداری شود. در مواردی مانند تب خال، خالکوبی، آبله مرغان، عفونت های قارچی یا باکتریایی، آکنه، آکنه روزاسه و حساسیت به سایر کورتیکواستروئیدها بایستی قبل از مصرف دارو با پزشک معالج مشورت نمایید.

در افراد مبتلا به سندروم کوشینگ و HPA axis suppression با احتیاط و تجویز پزشک مصرف شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه C. از آنجایی که مطالعات کافی در رابطه با مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی انجام نشده، لذا تنها در صورت تجویز پزشک قابل استفاده است.

مقدار و نحوه مصرف:

قبل از استفاده از پماد، محل مورد نظر را شسته و تمیز نمایید. سپس یک لایه نازک از پماد را ۲ تا ۳ بار در روز بر اساس شدت ضایعه، بر روی موضع بمالید. در صورتیکه بعد از گذشت ۲ هفته پیشرفتی در درمان حاصل نشد به پزشک مراجعه کنید.

عوارض جانبی دارو:

هر دارویی به موازات اثرات درمانی خود ممکن است باعث بروز عوارضی ناخواسته نیز شود. اگرچه تمامی این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر گونه عوارض جانبی به پزشک مراجعه فرمایید.

عوارضی از جمله: واکنش های درماتیت تماسی، آتروفی پوست، سوزش، خارش، خشکی، التهاب، سردرد، تحریک پذیری موضعی، تلانژکتازی، سرکوب محور HPA اختلال بینایی

شرایط نگهداری:

- دارو در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.
- دارو دور از نور مستقیم نگهداری شود.
- درب تیوپ را پس از هر بار مصرف محکم ببندید.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

دارنده پروانه ساخت:

شرکت ژرف اندیشان نوید سلامت (ژانوس)

تهران-ایران

