

ژل موضعی ژانو-بریم®

بریمونیدین ۰.۳۳ درصد (بریمونیدین تارتارات)

موارد مصرف :

ژانو-بریم به عنوان درمان موضعی در افرادی که قرمزی پوست ناشی از آکنه روزاسه (rosacea) دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمای عمومی بیمار:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.
- دارو را مطابق با تجویز پزشک و در فواصل زمانی مشخص شده مصرف کنید. از مقادیر تجویز شده توسط پزشک تجاوز نکنید.
- این دارو فقط برای استعمال خارجی است.

مکانیسم اثر:

ژل موضعی ژانو-بریم یک آگونیست آلفا آدرنرژیک است که رگ های خونی پوست را منقبض کرده و موجب کاهش قرمزی ناشی از آکنه روزاسه می شود.

موارد منع مصرف :

- در افرادی که به بریمونیدین یا هر کدام از مواد تشکیل دهنده ی آن حساسیت دارید ، منع مصرف دارد.
- برای کودکان زیر دو سال منع مصرف دارد.

هشدارها و احتیاط ها :

- ژانو-بریم مناسب افراد بزرگسال (۱۸ سال به بالا) است ؛ لذا استفاده این ژل برای کودکان توصیه نمی شود.
- ژانو-بریم نباید روی پوست تحریک شده و یا زخم های باز استفاده شود.
- از تماس با چشم ها، غشاء مخاطی مثل دهان و بینی و دستگاه تناسلی خودداری شود.
- بلافاصله پس از مصرف این دارو، دست ها با آب شسته شود.
- از دسترسی کودکان دور نگه داشته شود.
- در صورتی که دارو سہوا بلعیده شد، فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنید.
- در موارد زیر قبل از استفاده از ژانو-بریم ضروری است با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید :
- اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید، یا در دوران شیردهی هستید.
- اگر مشکلات قلبی - عروقی دارید.
- اگر مشکلات کلیه و کبد دارید یا سابقه آن را در گذشته داشته اید.
- اگر افسردگی، اسکیزودرما، هرگونه مشکلات گردش خون یا کاهش گردش خون در مغز یا قلب و یا سندروم شوگرن دارید.
- اگر قصد استفاده از هرگونه لیزر درمانی را دارید.

تداخلات دارویی:

- مهارکننده ی مونو آمین اکسیداز (MAO) که منجر به افت فشار خون می شود.
- داروهای بیهوشی، آرام بخش ها، مواد مخدر، الکل و نوشیدنی های الکلی
- داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و چهار حلقه ای که بر انتقال نورآدرنرژیک تأثیر می

گذارند و داروهایی که می توانند روی متابولیسم و جذب گردش آمین ها تاثیر بگذارند مثل :
کلر پرومازین، متیل فنیدات، رزپین
• مصرف آلفا ۲ آگونیست ها، بتابلاکر ها و سایر داروهای کاهنده ی فشار خون، گلیکوزیدهای قلبی

بنابراین در صورتی که داروهای دیگری استفاده می کنید؛ ضروری است با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.

نحوه مصرف:

همیشه نحوه مصرف را طبق دستور پزشک و یا داروساز خود انجام دهید.
اگر بعد از گذراندن ۵ روز از دوره مصرف، علائم بهبودی مشاهده نکردید با پزشک و یا داروساز خود تماس بگیرید.

مقدار مصرف در بزرگسالان :

دارو را روزانه به اندازه یک نخود به طور یکنواخت و به صورت یک لایه نازک، بر روی پیشانی، چانه، بینی و گونه ها بمالید. مقدار داروی استفاده شده در روز، نباید از یک گرم تجاوز کند.
مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

گروه B. مطالعات کافی و کنترل شده در رابطه با این ژل در زنان باردار وجود ندارد. این ژل موضعی تنها در صورتی در دوران بارداری استفاده می شود که بصورت بالقوه منفعت آن بیش از ریسک های آسیب پذیر آن باشد. هنوز مشخص نیست که این دارو در شیر مادر ترشح می شود یا خیر، لذا در دوران بارداری و شیر دهی حتما با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف بیش از حد دارو به اورژانس و یا مرکز فوریت های پزشکی مراجعه کنید.

عوارض جانبی:

شایع ترین عوارض که مشاهده شده است، قرمزی، خارش، و احساس سوزش در پوست صورت می باشد.

عوارض احتمالی غیر شایع :

شدیدتر شدن روزاسه، بیماری یا تحریکات پوستی، احساس سرما یا گرما در پوست، خشکی زبان، ورم کردن پلک ها و یا صورت، سردرد، درد و گزگز پوستی، خشکی پوست، گرفتگی بینی، آکنه، تاری دید و مشکلات تنفسی.

در صورت مشاهده هر یک از عوارض بایستی مصرف دارو را قطع کرده به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری :

در دمای اتاق (کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد) نگهداری شده و از یخ زدگی محافظت شود.

دارنده پروانه ساخت:

شرکت دانش بنیان ژرف اندیشان نوید سلامت (ژانوس)

تهران- ایران

